
版本号:250801**Zero Background pTOPO-TA/Blunt Cloning Kit****零背景 pTOPO-TA/Blunt 克隆试剂盒****目录号: CV21****❖ 试剂盒组成、储存、稳定性:**

试剂盒组成	20/40 次(CV2101)	80/160 次(CV2102)
pTOPO-TA/Blunt Vector(30 ng/ μ l)	20 μ l	80 μ l
1000 bp Control (30 ng/ μ l)	5 μ l	5 μ l
10 $\times$ Enhancer	20 μ l	80 μ l

▲ 本 TOPO 载体连接体系按照 10 μ l 一次计算可以用 20 次, 如果按照其它公司产品 5 μ l 一次计算, 使用次数可以增加一倍, 20 次可用 40 次。

▲ -20°C 储存, 至少 12 个月。冰袋运输, 1-2 天置于室外常温不影响质量。

❖ 产品介绍:

本制品和传统的T4连接酶原理不同, 它利用了Topoisomerase可以在瞬间(几秒钟-几分钟)、高效(接近100%)连接DNA片的原理采用本公司独创的工艺制成。

1. 可以在瞬间(几秒钟-几分钟)完成**任意PCR产物(兼容A末端/平末端)**连接。
2. 特制的新型载体质粒大小仅仅不到2kb, 充分发挥了TOPO载体越小, 可容纳片段越大的优势, 最大限度提高了大片段连接效率; 连接后质粒大小比传统载体小2kb以上, 质粒越小, 转化效率越高, 极大的提高了各种片段连接后的转化子数量。
3. 采用氨苄抗性载体只需0-10分钟复苏时间, 比卡那抗性载体1小时复苏时间缩短6倍。
4. 最快可以省略1小时复苏步骤, 热休克冰浴后, 不用加LB复苏, 直接将感受态涂板即可。从连接到涂板全程只需15分钟。
5. 自杀基因零背景原理, 无自连假阳性, 无需繁琐蓝白斑筛选和菌落PCR筛选。大部分情况下随机挑一个克隆便是有插入的(接近100%)。
6. 连接长片段能力远超传统TA克隆载体, 可连接长达10 kb片段(例如连接5 kb片段, 也可能达到挑10个菌落, 至少8个是有插入的效果), 是新一代世界领先的简单、快速、零背景免筛选的TOPO TA克隆载体。

注意：测序只能采用 M13F/M13R 通用引物测序（见后面图谱），但是不能采用 M13(-47)/M13(-48)通用引物测序。

❖ **操作步骤：**

1. 连接反应的准备：

PCR引物使用正常设计的引物即可，不需做任何改变（不能用磷酸化引物）。任意PCR产物（兼容A末端/平末端）均可以直接连接。PCR产物一般建议胶回收纯化（货号：DR01），这样可以避免后续可能的问题。如果PCR产物仅有目的条带、无非特异条带和引物二聚体，也可尝试直接进行连接反应。如果是质粒为模板的PCR产物则最好进行纯化，因为模板质粒也可能长出菌落（但不是想构建的目的载体）。

2. 连接反应：

1) 室温设立 10 μ l 连接体系（建议用 0.2 ml PCR 管，PCR 仪器控温）：

纯化后的 PCR 产物/或者 1 μ l 1000 bp Control	0.5-5 μ l
pTOPO-TA/Blunt Vector	1 μ l
10 $\times$ Enhancer	1 μ l
灭菌水	X μ l
总体积	10 μ l

加完试剂后，用移液器轻轻吹打混匀或者轻弹管底混匀，低速瞬时离心收集所有液体在离心管底，**注意此步骤不能在冰上进行，只能在室温（25°C-37°C）进行。**

▲ 如果使用 5 μ l 体系连接，各成分按照比例减半使用，使用次数可以加倍。

不同大小插入片段的推荐用量（注意过量太多了，反而导致转化子减少）：

插入片段大小（bp）	推荐用量（ng）
100-1000	10-40
1000-2000	40-80
2000-5000	80-180

2) 37°C 连接 5 分钟（建议置 PCR 仪器上控温）。

▲ 本载体推荐室温（25°C-37°C）5 分钟完成连接。长片段或者连接困难片段可以延长连接时间到 10-15 分钟，温度可选 37°C，可显著增加转化子数量。

3) 连接产物置于冰上备用。立即接标准的感受态转化步骤或者快速转化步骤。

3. 快速转化：

- 1) 感受态细胞从-80℃ 拿出，迅速插入冰浴中，解冻融化（约 1-3 分钟左右）。
- 2) 立刻加入 5 μ l 连接液(最多可 10 μ l 连接液全加入，只要体积不超过感受态细胞体积的 1/10)，手指拨打(Flick)离心管底轻轻混匀(避免用枪吸打)，冰浴放置 5 分钟。
- 3) **热休克：**42℃ 水浴热休克 60 秒，迅速放回冰浴静置 2-3 分钟，该过程不要摇动离心管。

▲ 本公司技术连接效率比竞争对手高 10-100 倍，所以如果后续发现转化子很多，甚至长糊板子，做完热休克步骤后，**可以省略步骤 4（复苏）**，直接将热休克冰浴后的感受态细胞涂板，培养过夜即可。这样从连接到涂板全过程仅需要 15 分钟，超快速流程极大的简化了操作，缩短了时间。

- 4) **复苏(可选步骤)：**加 500 μ l LB 或者 SOC 培养基(不含抗生素)，37℃ 200 rpm 振荡培养 10-20 分钟。

▲ 根据我们的经验，一般可以直接将培养基（如从冰箱取出温度低，应事先置 37℃ 温箱回温至 22℃-37℃）加入到感受态细胞的 1.5 ml 离心管，盖上离心管盖，水平固定在振荡培养箱中振荡培养复苏即可，不需要转移到试管培养复苏。

▲ 一般商品化的感受态细胞不超过 2 kb 插入片段情况下，热休克后 10-15 分钟复苏可以得到足够多转化子，如果使用实验室自制的感受态效率低、或者转化子少、插入片段长的情况下可以提高复苏时间到 30-60 分钟以得到更多的转化子。

▲ 本公司技术连接效率比竞争对手高 10-100 倍，追求最简单最快速的用户可以**尝试省略步骤 4（复苏）**，直接将热休克冰浴后的感受态细胞涂板，培养过夜即可。熟悉超快速流程后，以后这样从连接到涂板全过程仅需要 15 分钟，超快速流程极大的简化了操作，缩短了时间。

- 5) 取 100-200 μ l 菌液涂板(培养板含氨苄青霉素 100 μ g/ml)，培养过夜。


4. 转化子的筛选鉴定：

本制品采用自杀基因零背景原理，无插入自连的细菌会自杀无法生长，因此几乎没有假阳性，一般情况下，可以达到所见即所得，只要是长出来的菌落正常（不是污染的杂菌，转化子数量也不算太少），基本就 100%包含插入。因此插入片段不超过 2-3kb 的情况下强烈建议不做菌落 PCR 鉴定,直接挑 1-2 个菌去测序。

- 1). 一般本公司 TOPO 载体阳性率非常高，所以菌落生长正常，数量也不是太少的情况下建议直接去测序（强烈建议不做菌落 PCR 筛选）。**注意测序引物不能采用 M13(-47)/M13(-48)通用引物测序。**

- 2). TOPO 载体的菌落 PCR 结果容易出现假阴性（就是菌 P 失败显示没有插入或者扩增大小不对，实际却是有插入的）。因此在使用菌 P 鉴定的情况下，如菌 P 结果阳性，一般可以相信此结果。如结果是阴性，或者显示扩增出大小和预期不符合，一般不可相信，要考虑到菌 P 结果假阴性的可能，需要直接去测序鉴定，测序成功的完成实验；测序不成功的可以进一步提取质粒跑电泳看大小，或者酶切鉴定来确认。
- 3). 用上述培养的白色菌落的菌液抽提质粒，插入片段较大的情况下，直接跑电泳看质粒大小就直接能鉴定出有插入的质粒，还可用 EcoR I/EcoR V 单酶切释放插入片段或用其它合适的酶切，琼脂糖凝胶电泳检查片段大小，确定是否含有目的片段。

❖ pTOPO-TA/Blunt 载体图谱：



pTOPO-TA/Blunt 载体

通用 M13 测序引物序列：

M13F: TGTAACACGACGGCCAGT

M13R: CAGGAAACAGCTATGACC

注：“M13 通用引物”有多种不同的序列，且个别引物合成公司默认的 M13 引物与此载体所用的 M13 序列有差异，合成使用前务必先核对序列。

❖ pTOPO-TA/Blunt 载体多克隆位点序列：

